LES *EURYMETOPUM* Bl. DE LA R. ARGENTINE

(Col. Cleridae)

par

MAURICE PIC

Le présent article a pour but de présenter une étude d'ensemble sur un genre de Coléoptères Clerides dont les représentants sont cantonés au Chili et dans la République Argentine (1), mais je ne m'occuperai içi que de la faune de ce dernier pays. J'ai publié d'autre part (Diversités Entomologiques VI, 1950 : 10 à 14) un synopsis faisant connaître plus de 20 espèces, alors nouvelles, avec quelques variétés, qui m'ont été procurées par notre collègue Wittmer et provenant de ses chasses faites dans la région des lacs (Parc National Nahuel Huapi).

Dans le catalogue des espèces et variétés du genre *Eurymetopum* Bl. rédigé par J. B. Corporaal et publié en 1947 (Ooerg. Tijdsch. Entom. LXXXVIII), cinq espèces seulement sont signalées de la R. Argentine conjointement avec le Chili, ce sont: *eburneocinctum* Spin., *maculatum* Bl., (ce dernier ayant comme synoyme *costicolle* Spin.), *parallelum* Fairm., Germ. (ayant comme synonyme *cinctipenne* Chevr.), *prasinum* Spin. et *semiprasinum* Chevr.

Je possède et connai bien deux de ces espèces sur lesquelles je vais dire quelques mots et que, d'autre part, je ferai figurer dans une reproduction augmentée du synopsis dont il a été parlé plus haut. *E. eburneocinctum* Spin. se reconnait au premier coup d'oeil, et est distinct ainsi de toutes les autres espèces dans cet article, par la présence sur les élytres d'une fascie prémediane en relief blanche, ou jaune. En surplus de cette fascie chaque élytre a sur sa base une macule claire arrondie, tandis que la coloration foncière et générale est noire. Les pattes sont rouges

(1) Sauf une espèce *viridaeneum* Gorh., décrit du Guatemala.

(forme typique) ou noires (v. *nigripes* Schl.). Chez la var. *obliquecruciatum* Corp., avec les pattes noires, les élytres ont deux bandes claires opposées ayant un dessin mimant celui de *Epiclines Gayi* Chevr. (espèce chilienne). L. 5-6 mill.

E. parallelum Fairm. Germ. Offre un dessin élytral particulier. Cette espèce, de coloration foncée, a sur les cotés des élytres une large bande longitudinale flave. Chez la var. *cinctipenne* Chevr. l'avantcorps et les pattes sont d'un rouge flave. L. 4,5 à 6 mill.

Les trois autres espèces anciennes, en partie variables, sont mal définies avec les descriptions et, dans la crainte de mal les interprêter, je ne les fais pas figurer dans mon synopsis et me contente d'en donner le signalement d'après les auteurs. Toutefois, je puis dire que celles-ci, par leur structure thoracique, sont voisines entre elles et aussi se rapprochent de mes créations: *subimpressum* et *multinotatum*.

E. maculatum Bl. Aurait pour synonyme *costicolle* (Chevr., mais cette synonymie, douteuse pour moi, serait à vérifier sur les types. Voici, pour cette espèce, la description de Blanchard: "Aeneum, pro parte cinereo villosum, capite aeneo, antice lineaque transversali fulvis; elytris obscure cinereis, singulo maculis duabus pollide miniaceis altera arcuata humerali, altera apicali, antennis pedibusque fulvis. L. 5 mill.". L'auteur dit aussi: "Les parties claires sont bordées de brun plus foncé que celui du reste des élytres".

Cette espèce, d'autre part, (ex. figure) apparait allongée avec un thorax étroit et long, bien moins large que les élytres, membres testacés, avant corps noir, élytres jaunes avec une large fascie postmédiane se joignant, sur la suture, à une macule postscutellaire non arrondie noires, base une peu marquée de foncé.

La description de *costicolle* Spin. est énigmatique et se rapporte à divers dessins, mieux vaut n'en pas parler.

E. prasinum Spin. A dessins des élytres variables. La aussi la description n'est pas précise et reste très enigmatique loin des types, mieux vaut donc n'en rien dire dans le risque d'une fausse interprétation.

E. semiprasinum Chevr. Voici le signalement descriptif abrégé de cette espèce qui m'est restée inconnue en nature. Je possède quelques exemplaires du Chili à élytres largement verts, mais qui ne cadrent pas avec la description: Membres pâles, tête pale en en avant, à vertex roux; prothorax allongé, roux, élytres verts de la base presque au sommet, au dela du milieu ornés d'une petite

macule oblique avec le bord marginal, la base et la sixième partie apicale rousses, poitrine et abdomen d'un roux pale, pattes flaves. L. 7 mill.

Le genre *Eurymetopum* Bl. rentrerait dans les Hydnocerinae avec les caractères principaux suivants: Tête proéminente avec les yeux gros et saillants, entiers ou très faiblement entaillés; palpes dissemblables; antennes courtes, peu épaissies au sommet; thorax sans arête latérale; tarses de 5 articles, mais le premier article, couvert par le deuxième, n'est pas visible en dessus.

Voici quelques indications maintenant pour assigner la place, auprès des anciennes espèces, de mes diverses dénominations récentes. Ces notes spéciales précèdent le synopsis (l'ancien publié augmenté de quelques espèces) qui lui-même sera suivi d'une série de diagnoses, celles-ci terminant et parachevant mon étude d'ensemble.

L'espèce *inaequalicolle* Pic (type d'un sous-genre particulier) est tout à fait à part avec son singulier thorax et les élytres qui présentent de nombreuses impressions inégales et j'ai crée pour elle le s. g. *Eurymetomorphon*. Cette espèce, étroite et allongée, est en partie foncée, les élytres ont un fond clair et sont mouchetés de macules noires, pas toutes régulières. L. 8 mill. Ce signalement descriptif suffit, je n'en reparlerai plus après la présentation de mon synopsis. Elle provient du Lac Traful.

Les *argentinum* Pic, *subimpressum* Pic (proches de *costicolle* Chevr. ou *maculatum* Bl.) sont caractérisés par le thorax allongé, relativement étroit, marqué d'une ponctuation rapprochée, ou peu écartée, sur fond mat, avec des inégalités en dessus. Les *flavipenne* Pic et *flavovittatum* Pic ont quelques rangées nettes de points sur les élytres se rapprochant du *fulvipes* Bl. et s'éloignant assez nettement ainsi des espèces qui suivent (sauf *granulosum* Pic, ayant une ponctuation irrégulière ou espacée sur les élytres). Le *granulosum* Pic peut se ranger près des deux espèces ci-dessus et aussi apparait voisin de *elongatum* Pic, du Chili, c'est une espèce à avant corps foncé, à élytres pales avec des macules foncées discales disposées les unes au dessus des autres avec les côtés en partie bordés de foncé. Le *iridipenne* Pic, de coloration foncière claire aux élytres avec des reflets irisés, ressemble un peu à *iridescens* Pic, du Chili, mais avec une forme moins allongée, une coloration générale différente, plus foncée; la tête est verte en arrière, testacée devant les yeux. Le *bipartitum* Pic, par sa coloration élytrale, est voisin de *semirufum* Frm. Germ. et *vagesignatum* Pic, n'est pas à éloigner de ce dernier en présentant une coloration largement roussâtre, assez spéciale; puis *lateapicale* Pic est

à rapprocher de *aurantiaconotatum* Pic, les élytres étant moins longs, à ponctuation fine moins nette, la bande claire non surélevée. Les espèces à élytres foncées avec le thorax entièrement rouge, ou bordé de clair, sont à rapprocher de *ruficolle* Phil. Les *nigrum* Pic, *Wittmeri* Pic et voisins, à coloration générale foncée, sans dessins clairs aux élytres, se rapprochent des *obscurum* Phil. et *aeneum* Phil.; *flavipes* Pic, ayant les pattes claires, est voisin de *simile* Schl. Les espèces foncées à dessin blanc médian sur le milieu des élytres se rapprochent: *paulonotatum* Pic (à pattes foncées) de *divisum* Pic (du Chili) et *notatipenne* Pic (à pattes claires) de *rufipes* Pic (du Chili), il est plus petit, non subparallele, son dessin élytral est réduit, les pattes sont moins robustes. *Alboapicale* Pic, voisin aussi de ces derniers, s'en distingue par une macule apicale claire supplémentaire. Le *nigrofasciatum* Pic est voisin de *nudatum* Spin. Passons maintenant au synopsis, complètant un peu en le reproduisant en majeure partie, celui déjà publié dans ma publication spéciale: "Diversités Entomologiques".

I. Thorax particulier, très nettement plus long que large et étroit, un peu noduleux en dessus avec una forte impression discale en V; élytres à nombreuses impressions inégales ..... s.g. *Eurymetomorphon* Pic
Espèce étroite et allongée, brune avec des parties claires, dessus à reflets métalliques; élytres jaunâtres, à nombreuses macules foncées, en partie jointes. L. 8 mill. ..... *inaequalicolle* Pic

II. Thorax non particulier, moins long, diversement élargi vers le milieu, sans à faible impression médiane; élytres dépourvus de nombreuses impressions ..... *Eurymetopum* s. *str.*

A Elytres noirs ayant vers leur milieu una bande éburnée, autrement dit avec fascie surélevée blanche ou jaunatre, diversement racourcie. Variable. L. 5-6 mill. ..... *eburneocinctum* Chevr.

A' Elytres dépourvus de fascie éburnée.

B Thorax à pontuation rapprochée, ou peu écartée, à fond mat ou à peine brillant, peu plus large vers le milieu, d'ordinaire à coloration bicolore rouge et foncé variable, parfois à avant corps entièrement, ou presque, roux (1).

1 Moins grand; élytres à fond clair avec des dessins noirs divers (sp. près *maculatum* Bl.) 2

— Plus grand; élytres à fond noirs, à macules rouges ou jaunes près de la base et au sommet. Les macules sont étendues et rouges, non divisées en avant (forme typique), ou plutôt jaunatres, raccourcies à l'apex et disjoint en macule et linéole antérieurement (v. *disjunctum* Pic) L. 7,5-8 mill. ..... *argentinum* Pic

(1) Dans cette division rentreraient les *prasinum* Spin. et *semiprasinum Chevr.* dont les élytres ont un fond largement vert, ainsi que *maculatum* Bl., qui se rapproche de *multinotatum* Pic.

2 Les dessins noirs des élytres ne sont disposés que sur les côtés sous forme d'une bande longitudinale, sinuée vers le milieu, en enclosant une partie claire impressionnée, fond des élytres jaunatre (forme typique), parfois verdatre (v. nov. *viridiscente)* L. 6-7 mill. .... *subimpressum* Pic

— Les dessins noirs des élytres sont en partie et variablement disposés les uns audessus des autres sur le disque ou sur la suture 3

3 Avant-corps largement foncé; élytres plutôt fasciés de noir *multinotatum* Pic

— Avant-corps entièrement, ou presque, roux, élytres plutôt maculés de noir ..... v. *rufithorax* Pic

B' Thorax à ponctuation plus ou moins espacée et à fond brillant, très élargi d'ordinaire vers le milieu, ou plutôt en avant.

1 Elytres sans rangées de points nets, à ponctuation plus ou moins irrégulière, ou espacée; thorax à coloration variée et, quand il est clair, non marqué de foncé sur les côtés 3

— Elytres ayant des rangées de points nets (parfois faiblement subsillionés) au moins prés de la suture, celles-ci plus au moins régulières; thorax roux en dessus, d'ordinaire marqué de foncé sur le côtés seulement .. 2

2 Elytres entièrement flaves et thorax non marqué de foncé latéralement (forme typique) ou élytres présentant sur les côtés une courte ligne entérieure foncée, tandis que le thorax est marqué de noir latéralement (var. *curtevittatum* Pic) ..... *flavipenne* Pic

— Elytres d'un noir mtallique, à bande longitudinale externe flave; le dessin noir est continu sur les côtés du thorax, mais plus étroit au milieu ..... *flavovittatum* Pic

3 Thorax entièrement foncé ou, plus rarement, foncé sur le disque, bordé de clair antérieurement et postérieurement; tête entièrement, ou en partie, foncée 9

— Thorax rouge ou roux, exceptionnellement (*vagesignatum* Pic) à reflets un peu irisés; tête rouge ou rousse (seulement foncée postérieurement chez *limbaticolle* Pic) 4

4 Elytres foncés, métalliques 7

— Elytres diversement roux avec, ou sans, fascie blanche prémédiane .. 5

5 Une fescie blanche prémédiane oblique sur les élytres 6

— Pas de fascie blanche vers le milieu des élytres.
Coloration générale du dessus à peu prèsuniforme roussatre avec une vague tache triangulaire préscutellaire brunatre .... *vagesignatum* Pic

6 Fascie très distincte; élytres largement noirs postérieurement, sauf à l'apex, la base étant jaunatre ..... *bipartitum* Pic

— Fascie peu distincte; coloration postérieure des élytres moins tranchée, plutôt brunatre ..... *paulosignatum* Pic

7 Thorax concolore, clair 8

— Thorax foncé au milieu, bordé de clair; élytres olivatres-métalliques; pattes en grande partie claires ..... *limbaticolle* Pic

8 Pattes entièrement claires; élytres d'un noir olivatre cuivreux *testaceimembris* Pic

— Quatre pattes postérieures en partie foncées; élytres verts *viridipenne* Pic

9 Thorax entièrement foncé; élytres entièrement foncés ou à parties claires (exceptionnellement largement roux postérieurement chez *lateapicale* Pic), parfois ornés d'une fascie ou macule prémédiane blanche, en outre à macule apicale chez *alboapicale* Pic. Les élytres exceptionnellement ont un fond blanc avec des parties foncées nettes (*nigrofasciatum* Pic) 11

— Thorax vert, bordé de clair aux extrémités; élytres clairs à reflets irisés, ou à macules verdatres 10

10 Elytres de coloration pale, à reflets irisés; tête vert, testacée devant les yeux .....*?viridipenne* Pic

— Elytres jaunes, à plusieures rangées de dessins foncés superposés, côtés en partie bordés de noir; tête foncée sauf parties buccales *granulosum* Pic

11 Elytres à coloration foncière foncée, entièrement foncés ou bien peu marqués et diversement de clair 12

— Elytres à coloration foncière blanche à parties jaunes avec des dessins noirs disposés longitudinalement, très détachés du fond *nigrofasciatum* Pic

12 Elytres unicolors, foncés 14

— Elytres bicolors, foncés avec parties claires 13

13 Avant corps robuste; élytres avec une bande prélatérale flave de la base à l'extrémité; avant corps foncé (forme type), ou avant corps rouge flave ainsi que les pattes (v. *cinctipenne* Chevr.) L. 4,5-6 mill. *parallelum* Frm. Germ.

— Avant corps peu large; élytres d'un noir olivatre à la base, jaunes au sommet et devant la portion claire à vague fascie blanche *lateapicale* Pic

14 Pattes entièrement foncées, ou avec les antérieures en partie rousses 16

— Pattes entièrement, ou presque, testacées 15

15 Pas de macule blanche aux élytres qui sont olivatres metalliques *flaviques* Pic

— Une macule blanche vers le milieu des élytres, ceux-ci à reflets cuivreux ..... *notatipenne* Pic

16 Pas de macule, ou fascie, blanche aux élytres 19

— Une macule, ou fascie, blanche vers le milieu des élytres 17

17 Pas de macule apicale en surplus 18

— Un macule apicale blanche en surplus; élytres d'un noir métallique ou olivatre ..... *alboapicale* Pic

18 Les élytres ont une macule réduite discale prémédiane, élytres largement cuivreux ..... *paulonotatum* Pic

— Les élytres ont une fascie raccourcie un peu triangulaire ne touchant pas la suture ni le bord externe; élytres plutôt olivatres métalliques v. *uninotatum* Pic

19 Tête entièrement foncée ou peu marquée de clair vers le labre; thorax plus court, plus ou moins dilaté au moins au milieu 20

— Tête largement testacée en devant; thorax plus long, peu dilaté au milieu ..... *nigrum* Pic

20 Elytres peu rugueux, à reflets dorés ou pourprés; antennes nettement claires à la base, du moins en dessous des articles 21

— Elytres très densement rugueux, bleus, sans reflets dorés ou pourprés; antennes plus foncées, premiers articles à peine marqués de jaune en dessous ..... *atricorne* Pic

21 Plus petit, antennes brièvement claires sur leur base et en dessous; élytres un peu cuivreux ..... *wittmeri* Pic

— Plus grand; antennes claires; élytres plutôt olivatres .. v. *ruficorne* Pic

Je vais terminer mon article en donnant les diagnoses de mes espèces présentées à peu près dans l'ordre du synopsis. Pour simplifier les signalements descriptifs, je dois dire qu'en général la tête est plus fortement (aussi souvent plus densément ponctuée) que le thorax et les élytres et que la pubescence pour la presque totalité des espèces est faite de poils blancs épars, semi hirsutes avec d'autres poils plus longs, dressés de coloration ordinairement obscure. Quand je n'indiquerai rien dans mes diagnoses on devra comprendre que l'espèce rentre dans la généralité du genre. La taille du plus grand nombre des exemplaires est de 5 à 6 mill.

argentinum Pic. Elongatum, subnitidum, diverse et distincte albo pubescente, longe et fusco hirsutum nigrum, paulo subaeneum,

capite antice, thorace pro parte (circa, aliquot in medio) antennis et pedibus pro parte rufis, elytris ad basin breve luteo maculatis, ante medium et apice rubro (forma typica) au luteo diverse (v. *disjunctum* Pic) signatis. Capite robusto, dense punctato, inter oculos biimpresso; thorace dense punctato, lateraliter sinuáto; elytris inaequale et diverse punctatis, parallelis, apice subarcuatis. L. q.5 - 8 mill. Lago Traful, 8.1.49; Lago Espejo, 7.2.49.

subimpressum Pic. Elongatum, nitidum albo pubescente et longe hirsutum, nigro-subaeneum, capite antice antennisque pro parte testaceis; thorace pro parte rufo; elytris luteis (forma typica), aut viridibus (v. *viridescente*. Pic) externe arcuate nigro lineatis (linea intus albo laut luteo vage marginata), postmedium externe impressis et densiore pubescentibus, his ante apicem paulo latioribus, minute et disperse punctatis; pedibus pro parte rufis. Capite dense, pro parte fortiter punctato; thorace elongato, lateraliter sinuato, supra pro parte inaequale, dense punctato. L 6 - 7 mill. Lago Traful et S. C. de Bariloche 26.1.49.

multinotatum Pic. Precedente vicinum sed elytris lateraliter non nigro lineatis, his diverse et multi (ad basim, ante et postmedium, prope apicem) nigro signatis. Thorace rufo, diverse nigro signato, aliquot bilineato (forma typica), aut rufo, non aut paulo nigro colorato et signaturis nigris elytrorum reductus (v. *rufithorax* Pic). L. 6 - 6,5 mill. Lago Traful 12.2.49; Lago Moreno 15.1.49.

La var. nouvelle *atrofasciatum* a les élytres, en dessous de leur milieu, ornés d'une large fascie noire sinuée et ces organes ont antérieurement des dessins foncés raccourcis, sans avoir une grande macule commune postescutellaire noire, ce qui est le cas de *E. maculatum* Bl. (ex figure).

flavipenne Pic. Elongatum, nitidum, paulo minute et sparse (elytris fortiore et pro parte regulariter punctatis) punctatum, capite thoraceque rufis aut flavis, antennis nigris, ad basin testaceis, pedibus flavis geniculis tarsísque nigris, scutello et infra corpore nigris, abdomine apice rufo. Elytris flavis (forma typica), aut ad basin externe reducte nigro lineatis (var. *curtelineatum* Pic). L. 5 - 5,5 mill. Lago Traful 7.2.49.

flavovittatum Pic. Precedente vicinum sed thorace lateraliter nigro marginato et elytris obscuris, lateraliter, ad basin usque ad apicem, flavo vittatis. L. 5,5 mill. Los Arrayanes, Nahuel Huapi 29.1.49; Lago Traful 8.2.49.

vagesignatum Pic. Elongatum, postice paulo latiore, nitidum, diverse, pro majore parte sparse punctatum, infra nigrum, supra refuscente, elytris pallidioribus, postscutellum brunneo maculatis, membris pro majore parte testaceis. L 6 mill. Cerro Catedral 28.1.49.

bipartitum Pic. Elongatum, subparallelum, nitidum, thorace et elytris pro parte minute et sparse punctatis, infra corpore nigro, supra rufum, elytris luteis, ante apicem late nigris et ad scutellum paulo obscuris, membris pro parte nigris, pro parte testaceis. Thorace robusto, lateraliter ante medium late dilatato rotundato. L. 5 - 5,5 mill. Lago Traful 12.2.49.

La var. nouvelle **atripes** a les pattes toutes noires et le dessin noir étendu antérieurement sur les côtés des élytres, reduisant la coloration claire basale.

paulosignatum Pic. Precedente vicinum, infra corpore nigro, abdomine apice nigro, supra rufum, elytris ad basin et apice pallidioribus, ante apicem late brunneis, ad medium vage albo notatis et ad scutellum paulo brunneis, his apice paulo latioribus. L. 5,5 mill. Bariloche 4.2.49.

limbaticolle Pic. Parum elongatum, subparallelum, nitidum, diverse punctatum, nigrum, supra paulo olivaceum, capite antice, thorace antice et postice membrisque pro parte testaceis. Capite inter oculos late impresso-foveolato; thorace sat robust, lateraliter prope medium dilatato, subarcuato; elytris ante apicem paulo latioribus, pro parte reducte plicatis. L. 5 mill. Cerro Catedral 28.1.49.

testaceimembris Pic. Elongatum, subparallelum, nitidum, diverse et sparse punctatum; capite inter oculos bifoveolato, rufotestaceum, infra corpore nigro, elytris nigro-subaeneis, membris testaceis. L. 6 mill. S. C. de Bariloche 26.1.49.

viridipenne Pic. Precedente vicinum, minus parallelum, capite et thorace fortiore punctatis, membris pro parte nigris, elytris viridibus. L. 5,5 mill. Cerro Catedral 18.1.49.

iridipenne Pic. Elongatum, sat angustatum, nitidum, minute et sparse punctatum, supra pro parte viride, pro parte flavo, capite postice thoraceque medio late et complete viridibus, elytris flavis, iridescentibus, infra corpore viride, membris bicoloribus, pedibus pro majore parte flavis. L. 5,5 mill. Lago Espejo 7.2.49.

granulosum Pic. Elongatum, nitidum, diverse punctatum, elytris pro parte granulatis, viride, thorace paulo luteo marginato, elytris flavis, multi viride maculatis et nigro punctatis, externe viride marginatis, membris fere totaliter testaceis: L. 6 mill. Llao Llao (Nahuel Huapi) 12.2.49.

nigrofasciatum Pic. Elongatum, parallelum, indistincte pubescente, sed longe hirsutum nitidissimum, nigro-olivaceum, capite antice et membris testaceis, femoribus pro parte et tarsis diverse picèis; elytris albis et luteis, distincte et multi nigro-signatis: Macula humeralis elongata, fascia discoidalis obliqua pro parte junctis, macula postmediana subquadrata, his pro parte variabiliter nigro punctatis. L. 4 mill. Lago Traful 15.2.49. Chez cette espèce il existe parfois une macule supplémentaire noire en dessous de l'écusson (v. nov. **prescutellare**).

lateapicale Pic. Parum elongatum, postice paulo latiore, nitidum, nigrum, metallicum, capite antice luteo, elytris dimidio postice luteis, ad medium albo fasciatis, antennis testaceis, pedibus nigris, tibiis anticis et intermediis apice tarsisque rufescentibus. Thorace robusto, ad medium dilatato subarcuato. L. 6 mill. Lago Traful 8.2.49.

flavipes Pic. Parum elongatum, paulo robustum, nitidum, nigro-viride olivaceum, capite antice et membris testaceis. Thorace sat robusto, antice valde dilatato-arcuato, sat fortiter et sparse punctato; elytris subparallelis, diverse pro parte fortiter punctatis. L. 5 mill. S. C. de Bariloche 26.1.49.

notatipenne Pic. Precedente vicinum sed robustiore, elytris cupreis et ad medium albo maculatis, pedibus posticis pro parte piceis, thorace minute punctato. L. 5 mill. S. C. de Bariloche 26.1.49.

alboapicale Pic. Elongatum, sat angustatum et parallelum, nitidum, nigro metallicum, capite antice testaceo, antennis pro majore parte testaceis, pedibus nigris, tibiis anticis apice paulo rufos, elytris ad medium oblique albo fasciatis et apice albo maculatis, his pro parte breve plicatis. L. 5 - 5,5 mill. Llao Llao 22.1.49; Lago Traful 12.2.49.

paulonotatum Pic. Parum elongatum, nitidum, supra nigro-olivaceum, elytris purpureo-cupreis, ad medium albo maculatis; antennis testaceis; pedibus nigris, tarsis rufescentibus. L. 4,5 - 5 mill. Lago Mascardi 21.1.49; San Carlos de Bariloche 26.1.49.

v.*uninotatum* Pic. Elytres verdatres, à macule blanche plus développée. Puerto Blest 10.2.49.

nigrum Pic. Elongatum, parallelum, nitidum, nigro-metallicum, capite antice testaceo, antennis testaceis, pedibus nigris, tibiis anticis pro parte testaceis. Thorace sat longe, antice mediocre dilatato, parum punctato; elytris parallelis, pro parte rugulosis. L. 6 mill. Lago Espejo 7.2.49.

atricorne Pic. Parum elongatum, nitidum, nigrum, capite thoraceque nigro viridescentibus, illo breve et lato, parum punctato; elytris cyaneis, postice paulo latioribus, dense punctatis et rugulosis, membris nigris, tibiis anticis pro parte testaceis. L. 4,5 mill. S.C. de Bariloche 26.1.49.

wittmeri Pic. Elongatum, subparallelum, nitidum, nigrum, supra viridescente, elytris paulo cupreis, membris late nigris. Thorace sat robusto, minute punctato; elytris pro parte reducte plicatis. L. 4,5 mill. S. C. de Bariloche 26.1.49; Cerro Catedral 28.1.49.

v.*ruficorne* Pic. Antennes testacées, élytres allongées, plutôt olivatres. L. 6 mill. Lago Traful 2.2.49.